




माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा



(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए)



नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी ☒ अंग्रेजी ☐

विषय रसायन विज्ञान

परीक्षा का दिन बुधवार

दिनांक 04/03/2026

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालन अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ: 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी (परीक्षक के उपयोग हेतु)			
प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1	9	19	
2	5	20	
3	10	21	
4	1½	22	
5	1½	23	
6	1½	24	
7	1½	25	
8	1½	26	
9	1½	27	
10	1½	28	
11	1½	29	
12	1½	30	
13	1½	31	
14	3	योग	56
15	3	प्राप्तांकों का कुल योग (Round off)	
16	3	अंकों में	शब्दों में
17	4	56	छत्तर
18	4		

परीक्षक के हस्ताक्षर


संकेतांक

37249

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 60 जी.एस.एम. ईको मैपलिथो कागज़ ही उपयोग में लिया गया है। 181/2026

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर ही अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी:-
 - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
 - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केल्व्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
 - (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिख कर लावें। टेबल के आस-पास कोई अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर लें।
 - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

30.1(i) (अ) n-हेक्सेन व n-हेप्टेन का मिश्रण(ii) (द) K_2SO_4 (iii) (ब) टेफ्लॉन(iv) (अ) 0(v) (अ) $\frac{1}{2}$ (vi) (द) रंदरफोर्डियम(vii) (स) Fe^{2+} (viii) (स) NO_2^- (ix) (ब) 4(x) (द) CH_3I (xi) (ब) फ्रॉन्जीन(xii) (अ) मेथेनॉल(xiii) (स) आइसोप्रोपिल ऐल्कीहॉल(xiv) (ब) CH_3COOH



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
५	(xv)	(द) ट्राइमेथिल ऐमीन
५	(xvi)	(स) sp^3
५	(xvii)	(द) ग्लाइकोजन
५	(xviii)	(ब) वैलीन
9	ऊ. 2	
५	(i)	घटती
५	(ii)	$K \text{ kg mol}^{-1}$
५	(iii)	बढ़ती
५	(iv)	दो
५	(v)	जिक
५	(vi)	कार्बल या ऐनेन्टियोमर समूह
५	(vii)	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{Br}$
५	(viii)	फार्मोलिन
५	(ix)	पिरामिडी
५	(x)	C



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
30.3		
(i)	उपरोक्त विलयन में - विलेय - <u>क्लोरोफॉर्म</u> विलायक - <u>नाइट्रोजन</u>	
(ii)	मर्क्युरी सेल में प्रयुक्त ऐनोड → <u>जिंक-मर्क्युरी अमलगम</u> <u>Zn(Hg)</u>	
(iii)	$\text{Ni}(\text{CO})_4$ में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था :- माना, निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था = x $x + 4(0) = 0$ $x + 0 = 0$ <u>$x = 0$</u> अतः निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था <u>शून्य</u> है।	
(iv)	'प्रचक्रण मात्र' चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है :- $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ यहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।	
(v)	निम्न प्रचक्रण संकुल का एक उदाहरण है :- <u>$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$</u>	
(vi)	S_N^2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ($3^\circ < 2^\circ < 1^\circ$)	
	$\text{CH}_3 - \underset{\text{Br}}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}} - \text{CH}_3 < \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{Br}}{\text{CH}} - \text{CH}_3 < \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Br}$	



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर		
	(vii)	प्रश्नानुसार, $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH} \xrightarrow[573\text{K}]{\text{Cu}} \text{X}=?$ एथिल ऐल्कोहॉल हल:- उत्पाद (X) का नाम $\Rightarrow$ एथेनॉल रासायनिक सूत्र $\Rightarrow$ $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$		
	(viii)	डाइऐजोनियम लवण का सामान्य सूत्र:- $\text{R/Ar}-\text{N}_2^+\text{X}^-$ यहाँ X = हैलोजन आयन, BF_4^-, आदि।		
10	(ix)	वांछित रासायनिक समीकरण इस प्रकार है:- (आइसोसायनाइड परीक्षण) $\text{CH}_3-\text{NH}_2 + \text{KCN} + \text{CHCl}_3 \xrightarrow{3\text{KOH}} \text{CH}_3-\text{NC} + 3\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ (मेथेनेमीन) पोटैशियम क्लोरोफॉर्म (मेथिल आइसोसायनाइड) हाब्सक्राइड		
	(x)	<table border="1"> <tr> <td> DNA में β-D-2-डिऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। </td> <td> RNA में β-D-राइबोस शर्करा होती है। </td> </tr> </table>	DNA में β-D-2-डिऑक्सीराइबोस शर्करा होती है।	RNA में β-D-राइबोस शर्करा होती है।
DNA में β-D-2-डिऑक्सीराइबोस शर्करा होती है।	RNA में β-D-राइबोस शर्करा होती है।			
		खण्ड - ब 30.4 <u>स्थिरवायी मिश्रण</u>:- ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है तथा वे स्थिर ताप पर एक साथ उबलते हैं, द्विघटकीय मिश्रण		



कहलते हैं।

न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरकवाथी :- ऐसे स्थिरकवाथी मिश्रण जो राउल्ट के नियम से घनात्मक विचलन दर्शाते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरकवाथी मिश्रण कहलते हैं।

उदा. - 95% एथेनॉल तथा जल का मिश्रण।

30.5 दिया है।

NaOH का दिया हुआ, द्रव्यमान, $W_2 = 16\text{ g}$

NaOH का मोलर द्रव्यमान, $M_2 = 40\text{ g mol}^{-1}$

विलयन का आयतन, $V_{\text{ml}} = 800\text{ ml}$

विलयन की मोलरता, $M = ?$

हल :- मोलरता के सूत्र से,

$$M = \frac{W_2}{M_2} \times \frac{1000}{V_{\text{ml}}}$$

$$M = \frac{16}{40} \times \frac{1000}{800}$$

$$M = 0.5\text{ mol L}^{-1}$$

(उत्तर)

30.6 दिया है।

अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, $k = 2.31 \times 10^{-3}\text{ s}^{-1}$

अभिक्रिया की अर्धजि, $t_{1/2} = ?$

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

हल:-

∵ वेग स्थिरांक की इकाई से,

⇒ अभिरिक्ता की कोटि, $n = 1$

प्रथम कोटि अभिरिक्ता के लिए अर्धचन्द्र के सूत्र से,

$$v_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$$

$$= \frac{0.693}{2.31 \times 10^{13}} \text{ sec}$$

$$= 3 \times 10^{12} \text{ sec}$$

(अ.र.)

30.7 द्वितीय संक्रमण श्रेणी (4d) एवं तृतीय संक्रमण तत्श्रेणी (5d) के तत्वों की त्रिज्याएँ लगभग समान होती हैं।

$$4d \approx 5d$$

इसका कारण लैन्थेनॉइड आकुंचन है। 4d तत्व से पहले लैन्थेनॉइड श्रेणी आ जाती है, जिसमें तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षकों में जाने की बजाए 4f कक्षकों में जाता है। क्योंकि 4f कक्षक का परिरक्षण प्रभाव 5d कक्षक से भी दुर्बल होता है। अतः परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ-साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है, परंतु परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है।

यही कारण है कि 5d श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएँ घट जाती हैं तथा 4d श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के लगभग समान होती हैं।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

30-8

(अ)


$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2 \Rightarrow$ पेन्टाएमीन क्लोराइड कोबाल्ट (III) क्लोराइड

(ब)

$K_3[Al(C_2O_4)_3] \Rightarrow$ पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेट ऐलुमिनेट (III)

30-9

अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में d-कक्षकों के विपाटन का नामांकित चित्र :-



30-10

ऐलिहाइड नाभिकरागी यौगज अभिक्रियाओं के प्रति कीरीन से अधिक क्रियाशील निम्न कारणों से होते हैं:-

(i)

त्रिविम बाधा :- ऐलिहाइडों में कार्बोनिल समूह के दोनों ओर एक ऐल्किल समूह तथा एक हाइड्रोजन होता है, जबकि कीरीन में कार्बोनिल समूह के दोनों ओर दो ऐल्किल समूह होते हैं। अतः ऐलिहाइडों में अपेक्षाकृत कम त्रिविम बाधा के कारण नाभिकरागी का योग आसान हो जाता है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या


परीक्षार्थी उत्तर

(ii) प्रेरणात्मक प्रभाव :- कीटोन में $+I$ प्रभाव के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश कम होता जाता है, जिससे नाभिकरागी का कार्बोनिल कार्बन की ओर आकर्षण नहीं हो पाता है, जबकि ऐल्डिहाइड में अपेक्षित $+I$ प्रभाव कमजोर होता है।



उ०.११

(अ) संयोजनिक अम्ल :-

संयोजनिक सूत्र :-

IUPAC नाम :- ब्यूटेन-1,4-डाइऑइक अम्ल(ब) धैरिक अम्ल :-

संयोजनिक सूत्र :-

IUPAC नाम :- बेन्जीन-1,2-डाइकार्बोक्सिलिक अम्लउ०.१२ ऐनिलीन की अनुनादी संरचनाएँ :-

उ०.१३ प्रोटीन का विकृतीकरण :- जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे - ताप में परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन जैसे - pH में परिवर्तन आदि किए जाते हैं तो हाइड्रोजन

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

बंदों में अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण गोलिका खुल जाती है और हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं।

इस कारण प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है।

- उदा०- (i) अंडे की सफेदी का स्कंदन।
(ii) दही का पचना।

30.14

(अ) अभिक्रिया की कोटि एवं आण्विकता में अंतर:-

	कोटि	आण्विकता
(i)	यह एक प्राथमिक मात्रा है।	यह एक सैद्धांतिक मात्रा है।
(ii)	यह प्राथमिक तथा जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित है।	यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित है।
(iii)	इसका मान शून्य, ऋणात्मक या भिन्न भी हो सकता है।	इसका मान सिर्फ धन पूर्णांक ही हो सकता है।

(ब) शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समकालित वेग समीकरण:-

शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण से,

$$r \propto [R]^0$$

$$r = k$$

$$-\frac{d[R]}{dt} = k$$

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

$$d[R] = -k dt \quad \text{--- (i)}$$

यदि $t=0$ पर $[R] = [R]_0$ तथा t समय पर $[R]$ हो तो,

समी (i) का निश्चित समाकलन करने पर,


$$\int_{[R]_0}^{[R]} d[R] = \int_0^t -k dt$$

$$[R] - [R]_0 = -kt$$

$$[R] = -kt + [R]_0 \quad \text{--- (ii)}$$


उपरोक्त समी. (ii) ही वांछित समाकलित वेग समीकरण है।

समी (ii) का ग्राफ:-



30.15

(अ) फ्रिडेलस्टाइन अभिक्रिया का रसायनिक समीकरण निम्न है:-





परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर


इस अभिक्रिया में हेलोऐल्केन की अभिक्रिया शुष्क एसीटेन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से करवाने पर आयोडोऐल्केन प्राप्त होते हैं।

(ब) हेलोऐल्केन की अभिक्रिया KCN से करवाने पर हमें उत्पाद ऐल्किल सायनाइड प्राप्त होता है क्योंकि KCN एक आयनिक यौगिक है।
अतः यह जलीय विलयन में आयनित होकर K^+ तथा CN^-
आयन देता है, जिससे वांछित उत्पाद प्राप्त होता है।



(ऐल्किल सायनाइड)

वही हेलोऐल्केन की अभिक्रिया AgCN से करवाने पर उत्पाद ऐल्किल आइसोसायनाइड प्राप्त होता है क्योंकि AgCN में Ag तथा C के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसकी प्रबलता के कारण N परमाणु ही अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर ऐल्किल समूह से बंध बना लेता है, जिससे आइसोसाइ ऐल्किल आइसोसायनाइड प्राप्त होता है।



(ऐल्किल आइसोसायनाइड)

उ०.६


(अ)

मेडोस्वीट से प्राप्त ऐल्डिहाइड का

नाम $\Rightarrow$ सैलिसिलिडिहाइड

IUPAC नाम $\Rightarrow$ 2-हाइड्रॉक्सी बेंजोइलडिहाइड

संरचना सूत्र $\Rightarrow$





(ब)

अगले पृष्ठ पर $\Rightarrow$

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(i)





(बेन्जीन)

(एथेनॉयल क्लोराइड)

एसीटोफीनीन

(मुख्य उत्पाद)

(ii)



(एसीटिक अम्ल)

एथेनॉल

(मुख्य उत्पाद)

खण्ड-द

30.17

(अ)

सेल विभव:-

जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसके इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभवों के अंतर को ही सेल विभव कहते हैं।
इसे सेल का विद्युत वाहक बल (emf) भी कहते हैं।
इसे वोल्ट में मापते हैं।

सूत्र:-

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cathod}} - E_{\text{anode}}$$


(ब) मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र आगे पृष्ठ पर है।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर



(सा) दिया है।

298K पर KCl विलयन की मोलरता, $M = 0.100M$

KCl विलयन की चालकता, $K = 0.0129 S cm^{-1}$

KCl विलयन की मोलर चालकता, $\Lambda_m = ?$

हल:- मोलर चालकता के सूत्र से,

$$\Lambda_m = \frac{K \times 1000}{M}$$

$$\Lambda_m = \frac{0.0129 \times 1000}{0.100}$$

$$\Lambda_m = 129. S cm^2 mol^{-1}$$

(उत्तर)

उप-18

(अ) सरल ईथर का उदाहरण है:- मेथॉक्सीमेथेन $\Rightarrow CH_3-O-CH_3$


(ब) प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की क्रियाविधि:-

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या


परीक्षार्थी उत्तर

(i)

अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण:-


क्रियाविधि:-

(ii)


 H_3O^+ आयन का निर्माण:-

(iii)

ऐल्कीन का प्रोटॉनीकरण एवं कार्बोनायन का निर्माण:-




(iii)

 H_2O अणु का नाभिकरणी आक्रमण:-

(iv)

विप्रोटॉनीकरण से ऐल्कोहॉल का बनना:-



अतः इस प्रकार हमें उत्पाद के रूप में ऐल्कोहॉल प्राप्त होता है। ऐल्कोहॉल का नाम - (प्रोपेन-2-ऑल)




परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

उत्तर :- प्रोपीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन :-
संक्षेप में,



वांछित उत्पाद प्रोपेन-2-ऑल प्राप्त होता है।

समाप्त

BSER-31/2026

17/3/2026

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न संख्या 10 का उत्तर

प्रश्न संख्या 10 का उत्तर

प्रश्न संख्या 10 का उत्तर

प्रश्न संख्या 10 का उत्तर

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-181/2026

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-181/2026

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-181/2026



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-181/2026



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-18/2026



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-181/2026



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

INSER-181/2026



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक


प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

PSER-18/2026

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या


परीक्षार्थी उत्तर

25





$$\frac{0.003}{10^{-1}} = 2.31 \times 10^{-3}$$

$$\frac{3}{10^{-12}}$$

$$3 \times 10^{12}$$



$$\frac{0.0129 \times 10000}{100}$$



$$\frac{4}{10} \times \frac{1000}{300} = 0.13$$

$$\frac{0.003}{2.31 \times 10^{-3}} = 0.231 \times 10^{-1}$$

